

LATVIJAS SAFARI KLUBS

Uzskaitē

Uzskaites veidi, to iedalījums

- Pēc dzīvnieku pēdām sniegā;
- Ar dzīvnieku dzīšanu;
- Pēc dzīvnieku ziemas ekskrementiem;
- Uzskaitē dzīvnieku barošanās vietās.

Pēc dzīvnieku pēdām sniegā

- Iepriekš plānojot maršrutus (ne vairāk kā 10-12 km);
- Maršruti pa kvartāla stigām, meža ceļiem;
- Katram dalībniekam uzskaites lapa, maršruta shēma;
- Vienota apzīmējumu sistēma(2A,-> <-, 5MC,utt.)
- Ar šādu metodi uzskaiti var veikt 2 dienas pēc kārtas, pirmajā dienā konstatētās pēdas nodzēšot;
- Neizmanto – Tūlīt pēc pirmā sniega, arī dziļa sniega apstākļos

Ar dzīvnieku dzīšanu

- Izdzenot 30% no pētāmās teritorijas, vai arī plānojot atsevišķus maršrutus;
- Iesaistot pietiekamu skaitu dzinēju, lai uzskaitē būtu maksimāli objektīva;
- Latvijā samērā reti izmantota un nepopulāra metode.

Pēc dzīvnieku ziemas ekskrementiem

- Uzskaiti veic aļņiem, staltbrieži, stirnas (briežveidīgie);
- Uzskaiti sāk pēc sniega nokušanas, turpina līdz zemsedzes saplaukšanai;
- Pēc šīs metodes iespējams noteikt aptuveno dzimumu attiecību (aļņi, staltbrieži);
- Latvijā plaši izplatīta metode.

Uzskaitē dzīvnieku barošanās vietās

- Pēc šīs metodes uzskaita tikai staltbriežus, mežacūkas;
- Tikai tur, kur pastāvīgas barošanās vietas, ne retāk kā 1 barotava uz 500ha

Bebri

- Uzskaiti veic pēc to apmetņu skaita, reizinot apmetņu skaitu ar vidējo bebru skaitu vienā apmetnē – 4;
- Par vienu apmetni uzskata katru bebru apdzīvoto km (Upēs, kur bebru darbība konstatējama nepārtrauktā posmā).

Vilki, lūši, medņi, rubeņi

- Pēc apstiprināta attiecīgās sugas aizsardzības plāna

Populācijas pieaugumu veidi

- Bioloģiskais pieaugums – Konkrētās populācijas kārtējā gadā visu piedzimušo mazuļu skaits;
- Saimnieciskais pieaugums – Līdz medību sezonas sākumam no bioloģiskā pieauguma izdzīvojušo īpatņu skaits, ņemot vērā dabiski bojā gājušos dzīvniekus;
- Gada pieaugums = Visi dzimušie mazuļi – dabiski bojā gājušie – legāli nomedītie īpatņi.